


## トリアージ判断用カード

### 一次トリアージ ◆ START 式 (ふるい分け) トリアージ



(日本 DMAT 資料を参考に作成)

## 二次トリアージ ◆ 並び替え / 順位づけトリアージ

### 赤：緊急（最優先）治療群（Ⅰ）

第1段階：生理学的評価	第2段階：解剖学的評価
意識：JCS 2桁以上 呼吸：9回/分以下、30回/分以上 脈拍：120/分以上、50/分未満 血圧：収縮期血圧 90mmHg 未満、 200mmHg 以上 SpO <sub>2</sub> ：90% 未満 その他：ショック症状 低体温（35度以下）	開放性頭蓋骨陥没骨折 外頸静脈の著しい怒張 頸部または胸部の皮下気腫 胸郭動揺、フレイルチェスト 開放性気胸 腹部膨隆、腹壁緊張 骨盤骨折（骨盤動揺、圧痛、下肢長差） 両側大腿骨骨折 四肢切断 四肢麻痺 穿痛性外傷 デグロービング損傷 15%以上の熱傷、顔面気道熱傷合併

### 黄：準緊急（待機的）治療群（Ⅱ）

評価など	傷病状態および病態
受傷機転	体幹部の挟圧 1肢以上の挟圧（4時間以上） 爆発 高所墜落 異常温度環境 有毒ガス発生 汚染（放射性物質、生物剤、化学剤による災害：NBC）

\*災害弱者（小児、女性、高齢者、妊婦、基礎疾患のある傷病者、旅行者 [外国人]）は、必要に応じて、余裕があれば準緊急（待機的）治療群（Ⅱ）に分類する。

\*受傷機転で重症の可能性があれば、一見軽症でも準緊急（待機的）治療群（Ⅱ）以上に分類する。